

| Miejsce trafienia: | Siła obrażenia: | Tabela Śmierci Efekt Trafienia: | Śmierć (Śmierć niezależnie od tego w jakim czsie zostanie udzielona pomoc) |
|--------------------|-----------------|--|---|
| Ucho | 1-2 | Wychodzi duży siniak, ewentualnie lekkie przecięcie. | X |
| | 3-4 | Dość mocne uderzenie, krwawiąca rana. | X |
| | 5-6 | Kawałek ucha szybuje w powietrze, bark zalewa się krwią. Przez 2 tury trafiony musi wykonać test WYTRZYMAŁOŚCI aby utrzymać równowagę. Przez ok. 1 godzinę nie słyszy na dane ucho. | X |
| | 7-10 | Ucho odlatuje z niesmacznym plasknięciem. Udany test WYTRZYMAŁOŚCI pozwala na zachowanie równowagi. Kolejny test na Wt powoduje, że raniony po 4 dniach odzyskuje słuch, jeśli test się nie powiedzie, słuch jest tracony w danym uchu (a raczej tym co po nim zostało) na zawsze. | X |
| | 11-... | Ucho odpada w całości (lub większej części). Słuch w danym uchu jest nie odwołalnie tracony (na zawsze). Ranny traci przytomność, a w przypadku udanego testu ZRĘCZNOŚCI napastnik trafia jeszcze w bark ofiary z siłą równą połowie zadawanego ciosu. | Jeśli rana nie jest opatrzona w przeciągu 12h może dojść do zakażenia i dalej do śmierci. |
| Oko | 1-2 | Oko zaczyna łzawić i trafiony przez 3 tury nic nie widzi na dane oko. | X |
| | 3-4 | Oko zostaje uszkodzone. Jeśli w przeciągu 24 godzin okiem opiekuje się lekarz, wzrok zostaje przywrócony. | X |
| | 5-8 | Oko wypływa, wzrok zostaje utracony na stałe. | X |
| | 9-... | Zostaje uszkodzony mózg | X |
| Łokiec | 1-2 | Duży siniak, ewentualnie lekko krwawiąca rana | X |
| | 3-4 | Duża rana, ręka drętwieje co daje -10 do testów z urzyciem rąk przez 2 tury. | X |
| | 5-7 | Ręka zostaje złamana. Test na WYTRZYMAŁOŚĆ pozwala na zachowanie przytomności. Wszystkie przedmioty trzymane w ręce są wypuszczane. | X |
| | 8-9 | Ręka zostaje prawie całkowicie odcięta, krwotok. | Jeśli pomoc nie jest udzielona śmierć po 10 T. |
| | 10-... | Ręka zostaje odcięta. Następuje krwotok | Jeśli pomoc nie jest udzielona śmierć po 5 T. |
| Kolano | 1-2 | Duży siniak, ewentualnie lekko krwawiąca rana | X |
| | 3-4 | Duża rana, noga boli przy każdym ruchu | X |
| | 5-6 | Równowaga jest tracona od razu, rana krwawi dość obficie. | X |
| | 7-9 | Kość pęka, równowaga zostaje stracona. Rana krwawi bardzo mocno. | Jeśli pomoc nie jest udzielona śmierć po 12 h. |
| | 10-... | Noga zostaje odcięta poniżej kolana. | Jeśli pomoc nie jest udzielona śmierć po 5 T. |
| Kroc | 1-2 | Bardziej boli niż rani. | X |
| | 3-4 | Ból nie pozwala na wykonywanie żadnych czynności przez 2 Tury | X |
| | 5-6 | Zostaje uszkodzony narząd płciowy. | Śmierć raczej nie ale 50% na bezpłodność. |
| | 7-... | Narząd jest odcięty (cały lub kawałek) | Śmierć po godzinie lub kilku dniach z powodu komplikacji. |
| Serce | 1-2 | X | Śmierć po 6T |
| | 3-4 | X | Śmierć po 3T |
| | 5-... | X | X |
| Żołądek | 1-2 | Stracenie tchu na turę | X |
| | 3-4 | Przeszywający ból w środkowej części brzucha. Spotęgowany wylewającym się kwasem żołądkowym na otwartą ranę żołądka powodującym potworne pieczenie rany. | Bez pomocy lekarskiej w stopniu zaawansowanym można przeżyć max. 25min |
| | 5-6 | Krew intensywnie wydostająca się z naczyń krwionośnych żołądka zalewa jamę brzuszną. Śmierć następuje w skutek utraty krwi i zaniknięciu krążenia, lub zakrzepu dostający się do serca. | Śmierć następuje w przeciągu minuty. |
| | 7-... | X | X |
| Trzustka | PATRZ | NA ŻOŁĄDEK | |
| Wątroba | 1-2 | Krew leje się jak z cebra. | Śmierć jeśli nie zostanie udzielona pomoc w ciągu 10 minut |
| | 3-4 | Wątroba rozpada się na części | Śmierć w ciągu minuty. |